

Tromboseprofylakse ved gynækologiske og obstetriske operationer

Formål

Beskrivelse af proceduren for forebyggelse af tromboembolisk komplikation efter gynækologiske og obstetriske operationer

Patient- og/eller personalemålgruppe

Læger og sygeplejersker ved Gynækologisk-obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital

Fremgangsmåde

Patientkategorier:

Tromboseprofylakse anvendes til patienter, der får foretaget abdominale eller vaginale indgreb af >1 times varighed.

Udelukkelseskriterier

- Hæmorrhagisk diatese
- Igangværende antikoagulationsbehandling
- Blødning fra indre organer
- Intrakraniel blødning
- Lever- eller nyreinsufficiens

Behandling:

Ved beslutning om operation tager lægen stilling til om patienten skal have tromboseprofylakse; en eventuel ordination indskrives i patientjournalen og i EPM.

- Patienten iføres graduerede støttestrømper (TED-strømper) før operationen.
- Inj. Innohep 3.500 i.e.sc. x 1 kl. 18 gives fra kl.18.00 på operationsdagen, dog tidligst 2 timer efter operationens afslutning.

Ved malign lidelse eller andre højrisikotilstande øges Innohep 4.500 i.e sc. x 1 kl. 18 fra operationsdagen til udskrivelsen.

Opstår tromboemboli seponeres den profylaktiske behandling og egentlig antikoagulationsbehandling iværksættes iht. sædvanlige retningslinier

Behandling med TED-strømper og Fragmin fortsættes til patienten forlader afdelingen.

Information til patienten:

Efter operationen gives let blodfortyndende behandling med indsprøjtning en gang dagligt samt støttestrømper som forebyggelse mod udvikling af blodprop.

Indikatorer

-

Afgrænsning/definitioner

Review-gruppe

Forfatter: Overlæge Lars Franch Andersen

Overlæge Thomas Bergholt

Sygeplejeleder Birgitte Ljunggreen Rasmussen

Klinisk sygeplejevejleder Birgitte Holst Wiehl

Søgeord

Tromboseprofylakse; Fragmin; heparin; TED-strømper; blodfortynding; operation; blodprop; årebetændelse

ICD10-koder

DT 81.9 Complicatio postoperativa u.spec.

Dansk lov

Referencer

Henvisninger og links